

DÉPRESSION ET SUICIDE CHEZ LES ÂINÉS



DIAGNOSTIC DE DÉPRESSION

- DURÉE : AU MOINS 2 SEMAINES
- HUMEUR TRISTE DÉPRESSIVE
- TROUBLES DU SOMMEIL
- CULPABILITÉ
- MODIFICATION DU DEGRÉ D'ACTIVITÉ
- BAISSSE DE CONCENTRATION
- MODIFICATION DE L'APPÉTÎT
- ANHÉDONIE (PERTE DU PLAISIR)
- BAISSSE DE L'ÉNERGIE
- IDÉES SUICIDAIRES



DÉPRESSION MASQUÉE CHEZ L'AÎNÉ

- ANXIÉTÉ, COMPORTEMENT DEMANDANT
- IRRITABILITÉ, HOSTILITÉ
- CHANGEMENT DE PERSONNALITÉ
- HYPOCHONDRIE
- PSEUDO-DÉMENCE
- MASQUE ULTIME : GLISSEMENT



DÉPRESSION VS DÉMENCE

- DÉBUT
- DURÉE
- HUMEUR
- PERTES COGNITIVES
 - MÉMOIRE
 - CONCENTRATION
 - PRAXIES
 - GNOSIES
- MOTIF DE CONSULTATION
- IMAGE DE SOI
- FACTEURS DE RISQUES



FACTEURS DE RISQUE DE SUICIDE

- SEXE
- ÂGE
- DÉPRESSION NON TRAITÉE
- TENTATIVES PRÉCÉDENTES
- ÉTHYLISME
- PERTE DU RATIONNEL
- DEUILS
- ISOLEMENT
- PLAN ORGANISÉ
- SOUFFRANCES ASSOCIÉES À LA MALADIE

